

مطالعه تأثیر بقایای چغندر قند (*Beta vulgaris* L.) و کلزا (*Brassica napus* L.) بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود (*Cicer arietinum* L.)

بهروز بابایی نژاد^{۱*} و علیرضا دادخواه^۲

۱- کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان

۲- دانشیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

چکیده

به منظور بررسی اثر آلودگی چغندر قند و کلزا بر روی ویژگی‌های علف‌های هرز غالب مزرعه و گیاه نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی شیروان در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون تیمار)، بقایای کلزا (۱/۵ کیلوگرم در مترمربع)، بقایای چغندر قند (۱/۵ کیلوگرم در مترمربع)، مخلوط بقایای چغندر قند و کلزا (هر کدام ۰/۷۵ کیلوگرم در مترمربع)، پاشش عصاره چغندر قند، پاشش عصاره کلزا و مخلوط پاشش عصاره چغندر قند و کلزا بود. نتایج نشان داد که ویژگی‌های مورد بررسی علف‌های هرز و گیاه نخود تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت، به طوری که در تیمار شاهد، تراکم (۷۸/۳) بوته در مترمربع، وزن خشک (۲۶۷۱/۷ گرم در مترمربع) و پوشش علف‌های هرز (۶۹/۸ درصد در مترمربع) مشاهده شد. بیشترین تأثیر بازدارندگی بر علف‌های هرز توسط تیمار پاشش عصاره کلزا و بقایای چغندر قند مشاهده شد، به طوری که تیمار پاشش عصاره کلزا، تراکم و وزن خشک علف‌های هرز را به ترتیب ۵۶/۷ و ۸۵/۸ درصد و تیمار بقایای چغندر قند پوشش علف‌های هرز و ارتفاع ساقه اصلی نخود را به ترتیب ۵۲/۶ و ۲۵/۶ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه نخود به ترتیب با ۳۲۹/۴ و ۱۸۰/۳۳ گرم در متر مربع برای تیمار پاشش عصاره کلزا مشاهده گردید. همچنین بالاترین شاخص برداشت در تیمار بقایای چغندر قند با ۵۹/۲ درصد به دست آمد. در مجموع نتایج نشان داد که تیمار پاشش عصاره آبی کلزا، با کنترل مطلوب و موثر علف‌های هرز و همچنین با داشتن بیشترین عملکرد نخود به عنوان تیمار برتر آزمایش بوده و پیشنهاد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: بقایای گیاهی، تراکم، مدیریت علف‌هرز، نخود، وزن خشک

مقدمه

مدیریت علف‌های هرز مستلزم آگاهی درباره علف‌های هرز و مبانی اکولوژیک مربوط به آنهاست (Rashdmohasel & Moosavi, 2006).

آنچه ضروری به نظر می‌رسد، ارائه روش‌های کاربردی برای پیشگیری و کاهش پویایی جمعیت علف‌های هرز است. از جمله راهکارهای زراعی در این زمینه با تأکید بر کمترین خسارت به اکوسیستم زراعی و گاهی آلودگی ناشی از کاربرد علف‌کش‌ها، می‌توان به مدیریت زراعی و بیولوژیک اشاره نمود. استفاده از مالچ‌ها و بقایای گیاهی از جمله این راهکارها می‌باشد. در این راستا عنوان شده است که نحوه مدیریت بقایای گیاهی، از جمله عوامل موثر بر کنترل جمعیت علف‌های هرز می‌باشد. بدین صورت که مخلوط کردن بقایای گیاهی به جامانده از کشت قبلی می‌تواند مشابه تناوب زراعی به صورت معنی‌داری از پویایی جمعیت علف‌های هرز بکاهد (Menan et al., 2006). همچنین گزارش شده است که کاهش جوانه‌زنی علف‌های هرز

یکی از راهکارهای بهینه‌سازی عملکرد محصولات زراعی به حداقل رساندن اثرات رقابتی علف‌های هرز است. استفاده از انواع مختلف ابزار کنترلی به نحوی که به گیاه زراعی آسیبی وارد نگردد، تحت عنوان مدیریت علف‌های هرز بیان می‌شود. کنترل علف‌هرز راهکار یا جزئی از راهبرد کلی مدیریت گیاهی است که شامل تقویت گیاهان مطلوب و فرونشانی گیاهان نامطلوب است (Zand et al., 2004). به عبارت دیگر مدیریت علف‌های هرز، رهیافتی است که در آن پیشگیری و کنترل نقش مشترک و توأمی ایفا می‌نمایند. این تعریف در بردارنده سامانه‌ای است که در آن از همه ابزارهای ممکن برای کاهش ازدیاد بانک بذریه، جلوگیری از رویش علف‌های هرز و به حداقل رساندن رقابت علف‌های هرز سبزشده با گیاه زراعی استفاده می‌شود. بنابراین

* نویسنده مسئول: behrouzbabaeinjad@gmail.com

مناسب، موضوع بسیار مهم و قابل توجهی می‌باشد و می‌تواند یک راهکار سودمند و جدید را در کنترل علف‌های هرز ارائه دهد. با توجه اهمیت گیاه نخود در رژیم غذایی و حساسیت آن به علف‌های هرز به دلیل فرم رشد و نمو آن از یک سو و کنترل علف‌های هرز با استفاده از روش‌های اکولوژیکی و کاهش کاربرد سموم شیمیایی از جمله استفاده از گیاهانی با پتانسیل بالای خاصیت دگرآسیبی نظیر کلزا و چغندر قند از سوی دیگر، این آزمایش با هدف بررسی خصوصیات جمعیت و تنوع علف‌های هرز و خصوصیات رشد و عملکرد نخود تحت تأثیر مقادیر بقایا و پاشش عصاره آبی کلزا و چغندر قند در شرایط آب و هوایی شیروان اجرا شد.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ با طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲۶ دقیقه و ارتفاع ۱۰۶۷ متر از سطح دریا انجام شد. جهت تهیه بقایای گیاهی، اندام هوایی چغندر قند (رقم جلگه) و کلزا (رقم آکاپی) از مزارع کشاورزی شهرستان شیروان جمع‌آوری شد.

نحوه تهیه زمین

این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۷ تیمار در سه تکرار شامل شاهد (صفر)، بقایای کلزا (۱/۵ کیلوگرم در مترمربع)، بقایای چغندر قند (۱/۵ کیلوگرم در مترمربع)، مخلوط بقایای چغندر قند و کلزا (هر کدام ۰/۷۵ کیلوگرم در مترمربع در مجموع ۱/۵ کیلوگرم در مترمربع)، پاشش عصاره چغندر قند (با غلظت ۱۵ درصد)، پاشش عصاره کلزا (با غلظت ۱۵ درصد) و مخلوط پاشش عصاره چغندر قند و کلزا (هر کدام با غلظت ۷/۵ درصد در مجموع ۱۵ درصد) انجام شد. در سال زراعی (پاییز) ۹۲-۱۳۹۱ ابتدا در زمین مورد نظر عملیات شخم انجام شد و پس از آن برای خرد کردن کلوخه‌ها از دیسک و همچنین برای مسطح کردن و یکنواخت شدن از لولر استفاده شد. پس از مراحل آماده‌سازی زمین، کرت‌بندی زمین (به ابعاد ۳×۳ متر) انجام شد و سپس در ۱۰ بهمن‌ماه، بقایای گیاهان چغندر قند و کلزا ۲۰ روز قبل از کشت گیاه نخود به مقدار ۱/۵ کیلوگرم در مترمربع و با عمق ۲۵-۰ سانتی‌متری خاک مخلوط گردید. قبل از اجرای آزمایش نمونه‌برداری از عمق ۲۵-۰ سانتی‌متری خاک جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی انجام شد که نتایج آن در جدول ۱ نشان داده شده است. با توجه به نتایج آزمایش خاک یک روز قبل از کاشت، کود اوره بر اساس ۴۰ کیلوگرم اوره در هکتار و فسفات

در اثر افزودن بقایای گیاهی به علت ترشح یک‌سری مواد به دنبال تجزیه بقایای گیاهی و اثر سوء آن بر جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز بوده است (Mallek et al., 2007).

اصطلاح آللوپاتی یعنی هرگونه اثر مستقیم یا غیرمستقیم، مضر یا مفید ترکیبات شیمیایی یک گیاه روی محصول سایر گیاهان و آللوکیمیکال‌ها مواد حاصل از عمل آللوپاتی به‌داخل محیط طبیعی رشد گیاه می‌باشد (Hjazi, 2000). مقدار و چگونگی رهاسازی مواد دگرآسیب در یک گونه خاص با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن بسیار متغیر می‌باشد و اندام‌های مختلف توانایی متفاوتی در تولید و آزادسازی مواد دگرآسیبی دارند (Guenzl et al., 1967). تاکنون تعدادی از ترکیبات دگرآسیبی مانند اسیدهای فنولیک، ترپنوئیدها، کومارین‌ها، ترین‌ها و کوئینون‌ها شناخته شده است که می‌توانند در سیر طبیعی رشد و نمو گیاهان اختلال ایجاد کنند و خسارت خود را به این طریق وارد کنند.

گزارش شده است که عصاره آبی چغندر قند در غلظت بالا (۲۰ میلی‌گرم در لیتر)، وزن خشک برگ، ساقه، و ریشه گیاه خرفه را به ترتیب ۹۶ درصد، ۸۶/۷ درصد و ۹۱/۹ درصد کاهش داده است (Dadkhan, 2012). مشخص شده است که کاربرد بقایای چغندر قند، پنبه و آفتابگردان یک ماه قبل از کشت چغندر قند باعث کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز سلمه تره (*Chenopodium album* L.)، خرفه (*Portulaca oleracea*) و پیچک صحرايي (*Convolvulus arvensis* L.) شده است، به طوری که بیشترین تأثیر بازدارندگی بر تراکم علف‌های مذکور مربوط به بقایای چغندر قند با کاهش ۵۹/۳ درصدی نسبت به تیمار شاهد همراه بوده است. (Jahani et al., 2015). محققان طی آزمایشی در شرایط مزرعه‌ای گزارش کردند که استفاده از بقایای کلزا دو هفته قبل از کشت سویا به صورت مخلوط با خاک باعث کاهش معنی‌دار ارتفاع و پوشش علف‌های هرز به ترتیب ۳/۳۳ و ۶۸ درصد شده است (Albogheish et al., 2014). شناخت و بررسی رابطه آللوپاتی چغندر قند و کلزا با سایر گیاهان زراعی و علف‌های هرز، امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا علف‌های هرز حساس به ترکیبات آزاد شده از بقایای چغندر قند، عموماً با نوعی تأخیر یا کاهش در جوانه‌زنی و رشد مواجه می‌شوند و می‌توان از این پتانسیل در کنترل انتخابی علف‌های هرز استفاده کرد. ممانعت از جوانه‌زنی بذور علف‌های هرز و نیز جلوگیری از رشد آنها، توسط گیاهان زراعی آللوپات مختلف، اهمیت بسیار زیادی دارد و مطالعه آنها بسیار سودمند می‌باشد. درک پتانسیل آللوپاتیک گیاهان زراعی مختلف، جهت مدیریت علف‌های هرز و استفاده به‌عنوان محصول پوششی در شخم حفاظتی، یا تنظیم یک تناوب

عمق سه سانتی‌متری قرار داده شدند. جهت اطمینان بیشتر در هر نقطه دو بذر در خاک قرار داده شد که پس از سبزشدن توسط قیچی باغبانی اقدام به تنک گردید. اولین آبیاری پس از کاشت و آبیاری‌های بعدی به فاصله هر هفت روز یک‌بار به شیوه نشتی صورت گرفت. اعمال تیمارهای پاشش عصاره‌ها بعد از ظهور علف‌های هرز غالب موجود شامل، علف شور (*Salsola dendrites*)، پیچک صحرایی (*Convolvulus arvensis*)، تاج‌ریزی (*Solanum nigrum*)، سوروف (*Echinochloa crus-galli*) و خرفه (*Portulaca oleracea*) در شرایط مزرعه کشت گیاه نخود انجام گرفت.

آمونیم بر اساس ۸۰ کیلوگرم در هکتار به‌طور یکنواخت در سطح کرت‌ها پخش و با خاک مخلوط گردید. سپس خطوط کاشت با فوکای دستی به فواصل ۲۰ سانتی‌متر ایجاد گردید. بذور مورد استفاده در این آزمایش دارای قوه نامیه ۹۵ درصد و درجه خلوص ۱۰۰ درصد بود. به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های قارچی قبل از کاشت بذور با قارچ کش بنومیل (دو در هزار) ضدعفونی گردید و سپس کاشت نخود (رقم محلی بجنورد) در اول اسفند ماه در شیارهایی که قبلاً توسط فوکای دستی ایجاد گردیده انجام گرفت. بذور به‌صورت خطی و به وسیله دست با فاصله ۵ سانتی‌متر از یکدیگر روی یک خط در

جدول ۱- خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش

Table 1. Soil physical and chemical characteristics for experiment cite

بافت Texture	میزان(درصد) Content (%)			میزان(پی پی ام) Content (ppm)			کربن آلی (درصد) Organic carbon (%)	اسیدیته pH	هدایت الکتریکی (دسی زیمنس بر متر) EC (dS.m ⁻¹)
	سیلت Silt	رس Clay	شن Sand	نیترژن (کل) Total nitrogen	فسفر قابل دسترس Available P	پتاسیم قابل دسترس Available k			
Clay-loam	35	40	25	65.5	12.5	186	0.76	7.81	2.92

قرار گرفتن پایه‌های یک گونه در یک سمت کوادرات چند درصد از سطح آن را اشغال می‌کند، سطح هر گونه در داخل کوادرات تخمین زده شد و بعد میانگین سطح پوشش هر گونه در هر تیمار تعیین گردید (Arefiyan et al., 2013). تعداد علف‌های هرز شمارش و به‌صورت جداگانه در آن و با دمای ۷۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت قرار داده شدند و زیست توده آنها اندازه‌گیری شد. عملیات برداشت همزمان با زردشدن غلاف‌ها و برگ‌ها با حذف اثر حاشیه‌ای در اوایل تیرماه انجام شد در این زمان همچنین ارتفاع ساقه اصلی، عملکرد و اجزای عملکرد نخود از سطح ۲۰ بوته (۰/۵ مترمربع) اندازه‌گیری شد. در پایان داده‌های آزمایش با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS 9.1 آنالیز گردید. مقایسه میانگین به کمک آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد انجام شد. نمودارهای مربوطه با استفاده از نرم‌افزار Excel 2003 رسم گردید.

نتایج و بحث

خصوصیات فلور و تنوع علف‌های هرز

نتایج این آزمایش نشان داد در مراحل اولیه به‌دلیل رشد کند نخود، افزایش تعداد گونه علف‌های هرز را در پی داشت. در نتیجه از میزان تنوع گونه‌ای بیشتری برخوردار بود؛ به‌طوری‌که در ابتدای دوره رشد گونه‌های مختلفی از علف‌های هرز حضور داشتند. گونه‌های مشاهده شده متعلق به هفت خانواده مختلف

نحوه تهیه عصاره، پاشش و نمونه‌برداری

جهت تهیه عصاره ۱۵ درصد مقدار ۱۵۰ گرم از بقایای چغندر قند و کلزا هر کدام را به‌صورت جداگانه خرد کرده سپس آنرا با ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر مخلوط کرده و در دمای ۳۰-۲۵ درجه سانتی‌گراد در آزمایشگاه برای مدت ۴۸ ساعت قرار گرفت. سپس با استفاده از کاغذ صافی (فیلتر) عصاره از بقایا جدا گردید. پاشش عصاره‌های چغندر قند و کلزا در سه مرحله که اولین مرحله پس از ظهور علف‌های هرز غالب (پس از کاشت نخود) در مزرعه انجام شد و مرحله دوم و سوم پاشش عصاره‌ها به‌ترتیب ۱۵ و ۳۰ روز پس از کاشت نخود صورت گرفت. محلول پاشی عصاره‌ها به‌وسیله سمپاش پشتی با حجم ۸ لیتر، نازل بادبزی و فشار ۲۰۷ کیلوپاسگال با حجم پاشش ۱۰۰۰ لیتر در هکتار (۱۰۰ میلی‌لیتر در مترمربع) در وضعیتی با آسمان صاف و آرام بعد از کالیبره کردن در شرایط مزرعه صورت گرفت.

برای نمونه‌برداری از تراکم، ارتفاع، ماده خشک و درصد پوشش علف‌های هرز، در ابتدا با استقرار تصادفی کوادرات ۰/۵×۰/۵ متری (در فاصله ۶۰ روز پس از کاشت گیاه نخود همزمان با بسته‌شدن کانوبی در اول اردیبهشت ماه) در هر یک از تیمارها و شمارش، تعداد پایه گونه‌های مختلف علف‌های هرز مشخص شد. سپس برای اندازه‌گیری سطح پوشش علف‌های هرز در این تحقیق با این فرض که در صورت

هرز کاهش یافت، به طوری که گونه‌های تاج‌خروس، سلمه‌تره، توق، قیاق و اویارسلام به‌طور قابل توجهی کاهش یافت (جدول ۲). محققان گزارش کردند که افزایش میزان کاربرد بقایای گندم و کلزا، در کاهش زیست‌توده، تراکم و نیز کاهش پویایی جمعیت علف‌های هرز مؤثر خواهد بود (Tehrani *et al.*, 2009). همچنین Jahani *et al.* (2015) کاهش تراکم و زیست‌توده بسیاری از گونه‌های علف‌های هرز را با استفاده از بقایای چغندر قند، پنبه، آفتابگردان گزارش نمودند. بنابراین می‌توان گفت که مخلوط پاشش عصاره آبی چغندر قند و کلزا روی جوانه‌زنی و رشد گونه‌های پیچک صحرایی و تاج‌ریزی تأثیر کمتری داشته است. نتایج مطالعه Zraei *et al.* (2014) نشان داد که بقایای محصولات زراعی همچون چغندر قند و کلزا سبب کاهش زیست‌توده و تعداد علف‌های هرز و حتی افزایش عملکرد نخود شد.

شامل اسفناج، تاج‌خروس، خرفه، گندمیان، پیچک، سیب زمینی و کاسنی بودند که در این میان، خانواده گندمیان با سه گونه غالب بودند. همچنین در بین گونه‌های مشاهده شده تعداد معدودی دارای چرخه زندگی چندساله و بیشتر گونه‌ها به صورت یکساله پهن‌برگ و یکساله باریک‌برگ بودند. علاوه بر این، هفت گونه پهن‌برگ و سه گونه جز علف‌های هرز باریک‌برگ بودند. این نتیجه چندان دور از انتظار نیست، زیرا گیاه نخود دارای چرخه زندگی یکساله بوده و طبیعتاً گونه‌های یکساله پهن‌برگ دارای رقابت بیشتری با این محصول خواهند بود. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که فراهمی منابع و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای رشد گونه‌های یکساله پهن‌برگ باعث افزایش درصد حضور آنها نسبت به گونه‌های یکساله باریک‌برگ شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد افزودن بقایا و پاشش عصاره آبی چغندر قند و کلزا، جمعیت و میزان حضور علف‌های

جدول ۲- تراکم نسبی (درصد) گونه‌های علف‌هرز نخود تحت تأثیر بقایا و پاشش عصار آبی چغندر قند و کلزا

Table 2. Relative density (percentage) of weeds in chickpea affected by residues and aqueous extracts of sugar beet and canola

مخلوط عصاره کلزا و چغندر قند Mix extract of canola & sugar beet	عصاره چغندر قند Extract of sugar beet	عصاره کلزا Extract of canola	بقایای کلزا و چغندر قند Mix residues of canola & sugar beet	بقایای چغندر قند Residues of sugar beet	بقایای کلزا Residues of canola	شاهد Control	چرخه زندگی Life cycle	خانواده Family	نام گونه علف‌هرز Weed species name
14.7	12.0	10.3	14.3	19.3	27.7	34.0	AB	Chenopodiaceae	علف شور <i>Salsola dendrites</i>
11.7	7.7	8.3	9.0	6.3	9.0	14.0	PB	Convolvulaceae	پیچک صحرایی <i>Convolvulus arvensis</i>
10.7	12.7	8.0	9.3	6.7	2.3	14.3	AB	Solanaceae	تاج‌ریزی <i>Solanum nigrum</i>
6.3	3.7	4.0	4.4	3.3	3.3	10.7	AG	Poaceae	سوروف <i>Echinochloa crus-galli</i>
4.4	3.7	3.3	2.7	1.7	4.0	5.3	AB	Porthulacaceae	خرفه <i>Portulaca oleracea</i>
-	-	-	-	1.0	-	1.0	AB	Chenopodiaceae	سلمه تره <i>Chenopodium album</i>
-	-	-	-	1.0	0.3	0.67	AB	Amaranthaceae	تاج‌خروس <i>Amaranthus retroflexus</i>
-	-	1.0	-	1.0	-	1.0	PG	Poaceae	اویارسلام <i>Cyperus rotandus</i> L.
-	-	1.0	-	-	-	1.3	AB	Asteraceae	توق <i>Xanthium strumarium</i> L.
-	-	-	1.0	-	1.0	1.0	AG	Poaceae	قیاق <i>Sorghum halepense</i> L.

* یکساله پهن‌برگ AB، یکساله باریک‌برگ AG، چندساله باریک‌برگ PG، چندساله پهن‌برگ PB

* PB: Perennial broad leaves, PG: Perennial grasses, AG: Annual grasses and AB: Annual broad leaves

جدول ۳- آنالیز واریانس تراکم، ارتفاع، وزن خشک و پوشش علف‌های هرز ۶۰ روز بعد از کشت گیاه نخود

Table 3. Analysis of variance of weed density, height, dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing

درجه آزادی df	تراکم Density						ارتفاع Height							
	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis	علف‌شور Salsola dendrites	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis	علف‌شور Salsola dendrites	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis
2	0.57 ^{ns}	1.47 ^{ns}	0.42 ^{ns}	16.71*	2.33 ^{ns}	22.84*	5.39 ^{ns}	12.15*	9.87 ^{ns}	1.10 ^{ns}				
6	4.19*	21.30*	47.76*	20.07*	232.41*	80.20*	1240.45*	126.79*	600.77*	1099.8*				
12	0.57	0.75	0.92	1.76	7.72	3.46	12.33	1.90	5.82	4.10				
-	21.0	16.8	10.5	14.1	14.6	8.7	9.0	4.6	5.1	5.4				

میانگین مربعات
Mean of squares

ادامه جدول ۳
Table 3. continue

درجه آزادی df	وزن خشک Dry weight						پوشش Coverage							
	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis	علف‌شور Salsola dendrites	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis	علف‌شور Salsola dendrites	خرفه Portulaca oleracea	سوروف Echinochloa crus-galli	تاج‌ریزی Solanum nigrum	پیچک صحرائی Convolvulus arvensis
2	17.50 ^{ns}	68.88 ^{ns}	2.23 ^{ns}	0.44 ^{ns}	9.37 ^{ns}	1.65*	3.46*	0.46 ^{ns}	4.33*	68.86*				
6	104.72*	631.74*	21.04*	37.39*	709.26*	1.15*	7.48*	2.77*	18.98*	1113.9*				
12	12.52	19.77	0.70	4.02	2.96	0.37	0.39	0.50	0.80	53.81				
-	18.8	33.7	14.3	21.7	11.1	19.1	10.5	7.9	15.3	10.1				

میانگین مربعات
Mean of squares

* and ns: significant at $P \leq 0.05$ and non-significant, respectively

* و ns: پدیده‌ی معنی‌داری در سطح احتمال ۰/۰۵ و عدم معنی‌داری می‌باشند.

منابع تغییرات S.O.V	منابع تغییرات S.O.V	منابع تغییرات S.O.V	منابع تغییرات S.O.V
بلوک Block	بلوک Block	بلوک Block	بلوک Block
تیمار Treatment	تیمار Treatment	تیمار Treatment	تیمار Treatment
خطا Error	خطا Error	خطا Error	خطا Error
ضریب تغییرات (درصد) C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد) C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد) C.V (%)	ضریب تغییرات (درصد) C.V (%)

Dadkhah & Rassam (2016) اظهار نمودند که وجود بقایای کلزا و چغندر قند به میزان ۱/۵ کیلوگرم در مترمربع به صورت مخلوط با خاک به ترتیب باعث کاهش ۴۲/۷ و ۵۷ درصد تراکم علف‌های هرز در فاصله زمانی ۴۵ روز پس از کشت گیاه نخود شده است. همچنین Dadkhah (2014) گزارش نمود که کاربرد بقایا و پاشش عصاره آبی کلزا به ترتیب باعث کاهش ۶۷/۵ و ۴۱/۸ درصدی تراکم علف‌های هرز در مزرعه سویا شد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که قرارگیری بقایای کلزا و چغندر قند بر سطح خاک با محدود کردن میزان تشعشع خورشیدی رسیده به سطح خاک مانع جوانه‌زنی علف‌های هرز شد که این امر در نتیجه کاهش تراکم آنها را به دنبال داشته است. همچنین برخی تحقیقات نشان داده که اضافه کردن بقایای گیاهی کلزا به صورت مالچ در سطح خاک، سبب مهار و یا به تأخیر افتادن جوانه‌زنی بذر علف‌های هرز می‌شود (Fenwick *et al.*, 1983). در همین راستا Teasdale *et al.*, (1991) نیز کاربرد بقایای گیاهی را به عنوان راهکاری پایدار برای کاهش جمعیت و تراکم علف‌های هرز توصیه نمودند. این محققان همچنین اظهار نمودند که به منظور بهبود کاربرد بقایای گیاهی در کنترل علف‌های هرز، توجه به نوع و مقدار بقایای گیاهی اضافه شده به خاک ضرورت دارد.

ارتفاع علف‌های هرز

بقایا و پاشش گیاهان مورد آزمایش تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع علف‌های هرز داشت (جدول ۳).

نتایج حاصل از نمونه برداری علف‌های هرز ۶۰ روز پس از کشت در جدول ۴ نشان داده شده است. نتایج این آزمایش بیانگر آن است که ارتفاع علف‌های هرز تحت تیمارهای مختلف عکس‌العمل‌های متفاوتی از خود نشان دادند، به طوری که ارتفاع علف‌شور، پیچک صحرائی، تاج‌ریزی و خرفه ۶۰ روز پس از کشت در تیمار شاهد به ترتیب ۷۹/۸، ۷۰/۰، ۳۷/۲ و ۲۶/۵ سانتی‌متر مشاهده شد، در حالی که با توجه به نوع گیاهان (چغندر قند و کلزا) و روش مصرف (بقایا و پاشش عصاره) ارتفاع علف‌شور و پیچک صحرائی تحت تیمار مخلوط بقایای چغندر قند و کلزا به ترتیب ۶۴/۱ و ۶۳/۹ درصد و همچنین علف‌هرز خرفه تحت تیمار بقایای چغندر قند ۴۴/۲ درصد نسبت

بدین ترتیب با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که وجود خاصیت دگرآسیبی و مواد دگرآسیب در بقایای اندام هوایی چغندر قند و کلزا سبب کاهش جوانه‌زنی و رشد برخی گونه‌های هرز شده است.

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تراکم، ارتفاع، وزن خشک و پوشش علف‌های هرز تحت تأثیر بقایا و پاشش عصاره‌های گیاهی قرار گرفته است (جدول ۳).

تراکم علف‌های هرز

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ۶۰ روز پس از کشت نخود، تیمار شاهد با ۷۸/۳ بوته در مترمربع و تیمار پاشش عصاره کلزا با ۳۳/۹ بوته در مترمربع به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم علف‌هرز را داشته است (جدول ۴) که باعث کاهش ۵۶/۷ درصدی تراکم علف‌های هرز نسبت به تیمار شاهد شده بود. تراکم علف‌های هرز علف‌شور، پیچک، تاج‌ریزی، سوروف و خرفه در تیمار شاهد به ترتیب با ۱۴، ۳۴، ۱۴، ۱۴/۳، ۱۰/۷ و ۵/۳ بوته در مجموع با تراکم ۷۸/۳ بوته در مترمربع بود که نشان از بانک بذر قوی علف‌های هرز در زمین محل اجرای طرح دارد. به کاربرد بقایای گیاهان چغندر قند و کلزا به صورت مخلوط با خاک و همچنین پاشش عصاره چغندر قند و کلزا به صورت محلول‌پاشی توانست جوانه‌زنی و ظهور علف‌های هرز غالب مزرعه را به طور قابل توجهی کاهش دهد. همچنین تراکم علف‌های هرز پیچک صحرائی، سوروف و خرفه تحت تیمار بقایای چغندر قند به ترتیب ۵۵، ۶۹ و ۶۷/۵ درصد نسبت به شاهد، کاهش معنی‌دار نشان دادند و بقایای کلزا باعث کاهش ۸۳ درصدی تراکم تاج‌ریزی نسبت به شاهد شد. تأثیرات بازدارندگی شدید بقایای چغندر قند و کلزا احتمالاً به علت تجزیه تدریجی بقایا و آزاد شدن مواد آلوکمیkal موجود نظیر فنول‌ها و گلوکوزینولات با گذشت زمان می‌باشد. با توجه به این نتایج می‌توان گفت که از این دو گیاه زراعی با رعایت اصول زراعی می‌توان در کنترل علف‌های هرز استفاده نمود.

کاهش تراکم علف‌های هرز تحت تأثیر مصرف بقایا و عصاره آبی گیاهان دگرآسیب توسط برخی دیگر از محققان نیز به تأیید رسیده است (Sayed sharifi *et al.*, 2007).

کشت نخود به ترتیب ۵۷/۶ و ۷۸/۲ درصد وزن خشک علف‌های هرز را نسبت به شاهد کاهش داد (Dadkhah & Rassam, 2015).

نتایج دیگری مؤید این مطلب است که گیاهان چغندر قند و کلزا بر رشد علف‌هرز تاج‌ریزی تأثیر بازدارندگی داشته است، به طوری که با افزایش غلظت عصاره‌های آبی تا ۱۵ درصد، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه تاج‌ریزی را به ترتیب ۷۳ و ۶۶/۵ درصد کاهش داده است. همچنین بیان داشتند که از این دو گیاه با رعایت اصول مدیریتی و زراعی می‌توان در جهت مدیریت علف‌هرز تاج‌ریزی در شرایط مزرعه استفاده نمود (Babaeinjad et al., 2014).

پوشش علف‌های هرز

تجزیه واریانس داده‌ها نشان می‌دهد که میزان پوشش علف‌های هرز به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته است (جدول ۳).

نتایج حاصل از نمونه‌برداری پوشش علف‌های هرز به فاصله ۶۰ روز بعد از کشت گیاه نخود در جدول ۴ مشاهده می‌شود. در نمونه‌برداری از تیمارهای آزمایشی در مراحل اولیه رشد، علف‌شور و پیچک صحرایی از پوشش بیشتری برخوردار بودند که نشان‌دهنده رشد سریع این دو علف‌هرز می‌باشد، به طوری که این روند در علف‌شور در مراحل آخر رشد به بالاترین میزان رسید. بیشترین میزان پوشش در بین علف‌های هرز غالب مزرعه در تیمار شاهد برابر ۶۹/۸ درصد از هر مترمربع بود که علف‌شور و خرفه به ترتیب با ۳۴ و ۴/۳ درصد از هر مترمربع بیشترین و کمترین مقدار پوشش را دارا بودند. بیشترین تأثیر بازدارندگی بر پوشش علف‌های هرز در تیمار بقایای چغندر قند با ۵۲/۶ درصد مشاهده شد، به طوری که گیاهان علف‌شور، پیچک صحرایی و تاج‌ریزی بیشترین کاهش رشد را نشان دادند.

تأثیر بازدارندگی تیمارهای آزمایشی بر رشد علف‌هرز در مراحل اولیه رشد باعث می‌شود گیاه زراعی در رقابت با علف‌های هرز موفق‌تر ظاهر شود.

با گذشت زمان پوشش علف‌های هرز در مزرعه افزایش می‌یابد. اشغال بیش از ۳۴ درصد از فضا به وسیله یک علف‌هرز نشان از قدرت رشد و رقابت بالای آن دارد که نه تنها اثر گیاه زراعی، بلکه رشد سایر علف‌های هرز را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج این آزمایش از حاکمیت فرضیه پیش‌دستی اولیه در تسخیر فضا و متعاقب آن حاکم شدن علف‌شور در شرایط مزرعه حکایت دارد.

به شاهد کاهش نشان داد. با توجه به نتایج جدول ۴، بقایای گیاهان چغندر قند و کلزا در مقایسه با پاشش عصاره آبی چغندر قند و کلزا به میزان بیشتری ارتفاع علف‌های هرز سوروف و خرفه را کاهش داد. به نظر می‌رسد مخلوط کردن بقایای گیاهی با خاک، منجر به تجزیه و رهاسازی تدریجی مواد آلوکمیkal موجود در آنها در طی دوره رویش شده و این مواد از طریق ریشه جذب و مکانیسم‌های رشدی علف‌های هرز را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهند. این کاهش رشد علف‌هرز خرفه به حضور مواد فنولی حاصل از عصاره آبی چغندر قند نسبت داده شده است (Dadkhah, 2012).

وزن خشک علف‌های هرز

آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که تیمارهای آزمایشی وزن خشک علف‌های هرز را به طور معنی‌داری ($P \leq 0/05$) تحت تأثیر قرار داد (جدول ۳).

مقایسه میانگین وزن خشک اندام‌های هوایی علف‌های هرز تحت تیمارهای مختلف در شرایط مزرعه در جدول ۴ نشان داده شده است. در فاصله ۶۰ روز بعد از کاشت گیاه نخود، تیمار شاهد با ۲۶۷۱/۷ گرم در مترمربع بیشترین و تیمار پاشش بقایای چغندر قند با ۲۶۵/۷ گرم در مترمربع کمترین میزان وزن خشک علف‌هرز را داشته است. با توجه به نتایج جدول ۴ وزن خشک گونه‌های مختلف علف‌هرز بسته به حساسیت آنها به نوع گونه گیاهی به کار برده شده در تیمارهای آزمایشی (چغندر قند و کلزا) عکس‌العمل متفاوتی را نشان دادند.

از نتایج آزمایش این چنین نتیجه‌گیری می‌شود که با گذشت زمان تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن خشک علف‌هرز در واحد سطح بیشتر آشکار می‌گردد. در تیمار شاهد به دلیل عدم وجود مواد آلوکمیkal شرایط برای رشد و نمو علف‌های هرز مطلوب‌تر بوده و علف‌های هرز به طور موثرتری از عوامل اقلیمی از قبیل رطوبت و مواد غذایی استفاده نموده و رشد زیادتری داشته‌اند که منجر به افزایش ماده خشک در آنها شده است. در مقابل تیمارهای بقایا و پاشش عصاره گیاهان به خاطر تأثیر بازدارندگی در جوانه‌زنی، تراکم علف‌هرز، کاهش ارتفاع و به طور کلی کاهش رشد رویشی علف‌های هرز منجر به کاهش تجمع ماده خشک شده است.

برخی از محققان گزارش کرده‌اند که کاربرد بقایای کلزا و چغندر قند به صورت مخلوط با خاک در مزرعه نخود به طور معنی‌داری وزن خشک کل علف‌های هرز را کاهش داده است، به طوری که بقایای کلزا و چغندر قند در فاصله ۴۵ روز پس از

جدول ۴ - تأثیر تیمارهای مختلف بر تراکم، ارتفاع، وزن خشک و پوشش علف‌هرز ۶۰ روز پس از کاشت نخود
Table 4. The effect of different treatments on weed density, height, dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing


علف‌هرز Weed	تراکم (بوته در مترمربع) Density (plant m ⁻²)					ارتفاع (سانتی‌متر) Height (cm)						
	خرفه <i>Portulaca oleracea</i>	سوروف <i>Echinochloa crus-galli</i>	تاج‌ریزی <i>Solanum nigrum</i>	پیچک صحرایی <i>Convolvulus arvensis</i>	علف‌شور <i>Salsola dendrites</i>	جمع کل Total	کاهش نسبت به شاهد (%) Decreased compared to control (%)	خرفه <i>Portulaca oleracea</i>	سوروف <i>Echinochloa crus-galli</i>	تاج‌ریزی <i>Solanum nigrum</i>	پیچک صحرایی <i>Convolvulus arvensis</i>	علف‌شور <i>Salsola dendrites</i>
شاهد Control	5.3 ^a	10.7 ^a	14.3 ^a	14.0 ^b	34.0 ^a	78.3	-	26.5 ^a	48.3 ^a	37.2 ^a	70.0 ^a	79.8 ^a
بقایای کلزا Residues of canola	4.0 ^{bc}	3.3 ^c	2.3 ^c	9.0 ^b	27.7 ^b	46.3	40.9	19.3 ^b	26.8 ^{bc}	18.5 ^d	51.0 ^b	29.3 ^{cd}
بقایای چغندر قند Residues of sugar beet	1.7 ^d	3.3 ^c	6.7 ^d	6.3 ^c	19.3 ^c	37.3	52.4	14.8 ^c	28.8 ^{bc}	35.7 ^a	35.7 ^d	28.7 ^{cd}
بقایای کلزا و چغندر قند Mix residues of canola & sugar beet	2.7 ^{cd}	4.4 ^c	9.3 ^{bc}	9.0 ^b	14.3 ^d	39.7	49.3	18.4 ^b	23.5 ^e	32.7 ^b	45.0 ^c	26.0 ^d
عصاره کلزا Extract of canola	3.3 ^{bc}	4.0 ^c	8.0 ^{cd}	8.3 ^{bc}	10.3 ^d	33.9	56.7	26.3 ^a	32.3 ^b	25.3 ^c	45.3 ^{bc}	30.4 ^c
عصاره چغندر قند Extract of sugar beet	3.7 ^{bc}	3.7 ^c	12.7 ^a	7.7 ^{bc}	12.0 ^d	39.8	49.2	16.7 ^{bc}	42.5 ^a	31.0 ^b	25.3 ^c	28.7 ^{cd}
مخلوط عصاره کلزا و چغندر قند Mix extract of canola & sugar beet	4.4 ^{ab}	6.3 ^b	10.7 ^b	11.7 ^a	14.7 ^{cd}	47.8	39.0	27.2 ^a	33.0 ^b	27.0 ^c	50.7 ^b	38.7 ^b

در هر ستون میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک به روش LSD اختلاف معنی‌داری ندارند (P ≤ 0.05).
The mean values with one common letter within each column are not significantly (P ≤ 0.05) different according to LSD.

ادامه جدول ۴ - Table 4. continue

وزن خشک (گرم در مترمربع) Dry weight (g m ⁻²)		پوشش (درصد در مترمربع) Coverage (percent/m ²)		کاهش نسبت به شاهد (٪) Decreased compared to control (%)		کاهش نسبت به شاهد (٪) Decreased compared to control (%)							
خرفه <i>Portulaca oleracea</i>	سوروف <i>Echinochloa crus-galli</i>	تاج‌ریزی <i>Solanum nigrum</i>	پیچک صحرائی <i>Convolvulus arvensis</i>	پوشش <i>Salsola dendrites</i>	جمع کل Total	خرفه <i>Portulaca oleracea</i>	سوروف <i>Echinochloa crus-galli</i>	تاج‌ریزی <i>Solanum nigrum</i>	پیچک صحرائی <i>Convolvulus arvensis</i>	پوشش <i>Salsola dendrites</i>	جمع کل Total	کاهش نسبت به شاهد (٪) Decreased compared to control (%)	کاهش نسبت به شاهد (٪) Decreased compared to control (%)
141.5 ^a	507.2 ^a	139.4 ^a	212.4 ^a	1671.1 ^a	2671.7	4.3 ^a	8.5 ^a	11.0 ^a	12.0 ^a	34.0 ^a	69.8		
101.8 ^b	51.4 ^c	12.0 ^c	74.1 ^c	240.8 ^c	480.1	3.2 ^{bc}	3.3 ^c	9.2 ^b	6.0 ^c	14.7 ^e	36.4	47.9	
16.6 ^f	59.0 ^{bc}	40.8 ^a	34.1 ^e	115.2 ^e	265.7	3.2 ^{bc}	5.0 ^d	8.2 ^b	4.5 ^{cd}	12.3 ^c	33.2	52.6	
59.6 ^d	56.5 ^{bc}	84.3 ^b	64.8 ^d	154.4 ^d	419.6	2.3 ^c	5.8 ^{bcd}	8.5 ^b	8.0 ^b	28.3 ^b	52.9	24.3	
80.0 ^c	62.5 ^b	24.3 ^f	111.8 ^b	100.3 ^f	378.9	2.8 ^{bc}	6.2 ^{bc}	8.7 ^b	8.0 ^b	22.0 ^c	47.7	31.7	
51.7 ^e	27.0 ^d	56.6 ^c	71.8 ^c	86.1 ^g	293.3	3.5 ^{ab}	5.5 ^{cd}	8.5 ^b	4.0 ^d	19.0 ^{cd}	40.5	42.0	
75.5 ^c	30.3 ^d	34.8 ^d	73.9 ^c	251.1 ^b	465.6	3.0 ^{bc}	6.7 ^b	8.5 ^b	4.5 ^{cd}	15.7 ^{de}	38.4	45.0	

The mean values with one common letter within each column are not significantly ($P \leq 0.05$) different according to LSD.



تعداد غلاف، تعداد دانه، وزن ۱۰۰ دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت) در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گردید (جدول ۵).

صفات مورد مطالعه گیاه نخود
نتایج آنالیز واریانس حاصل از بررسی صفات نخود نشان داد که تأثیر بقایای گیاهی و پاشش عصاره حاصل از دو گیاه چغندر قند و کلزا بر روی صفات گیاه نخود (ارتفاع ساقه اصلی،

جدول ۵- آنالیز واریانس خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در تیمارهای مختلف

Table 5. Analysis of variance of growth, yield and yield components of chickpea plants in response to different treatments

منابع تغییرات S.O.V	درجه آزادی df	میانگین مربعات Mean of squares						
		ارتفاع ساقه اصلی Height of main stem	تعداد غلاف Pod number	تعداد دانه Seed number	وزن ۱۰۰ دانه 100-seed Weight	عملکرد دانه Seed yield	عملکرد بیولوژیک Biological yield	شاخص برداشت Harvest index
Block بلوک	2	0.86 ^{ns}	22.04 ^{ns}	10.90 ^{ns}	4.36 ^{ns}	1099.4 ^{ns}	1797.0 ^{ns}	21.28 ^{ns}
Treatment تیمار	6	97.97*	138.63*	185.82*	128.57*	2938.93*	9347.93*	76.86*
Error خطا	12	8.10	14.15	192.09	4.76	561.82	563.66	14.26
ضریب تغییرات (درصد) C.V%	-	8.6	13.9	18.0	9.8	17.2	9.0	7.1


* و ns به ترتیب معنی داری در سطح احتمال ۰/۰۵ و عدم معنی داری می باشند.

* and ns: significant at $P \leq 0.05$ and non-significant, respectively

آللوکمیkal موجود در بقایای چغندر قند و کلزا باشد که با خاک مخلوط شده بر تشکیل ریشه‌های موئینه و به تبع آن بر کاهش جذب آب در گیاه و در نتیجه کاهش ارتفاع تأثیرگذار می‌شود. محققان در مطالعات خود گزارش کردند که مواد آللوکمیkal در بقایای گیاهی می‌تواند باعث کاهش فشار اسمزی شیره سلولی شود و در نتیجه با تأثیر بر روی رشد بخش‌های مختلف گیاهان از جمله ارتفاع گیاه می‌تواند باعث بسته شدن روزنه‌ها گردد (De Neergard & Porter, 2001). همچنین کاهش رشد گیاه نخود توسط بقایای چغندر قند و کلزا که با خاک مخلوط شده می‌تواند در اثر تداخل ترکیبات آللوپاتیک در تقسیم سلولی (El-Khatib & Hegazy, 2004) و سنتز پروتئین‌ها و هورمون‌ها (De Neergard & Porter, 2001) باشد که در نهایت باعث کاهش رشد در سلول و منجر به کاهش ارتفاع می‌شود (El-Khatib & Hegazy, 2004).

ارتفاع ساقه اصلی گیاه نخود

نتایج حاصل از آنالیز واریانس حاکی از این می‌باشد که ارتفاع ساقه اصلی گیاه نخود به طور معنی داری تحت تأثیر بقایا و پاشش عصاره دو گیاه چغندر قند و کلزا قرار گرفت. متوسط ارتفاع ساقه در تیمار شاهد (وجود علف‌های هرز) معادل ۳۱/۳۸ سانتی متر بود. همان‌طور که در شکل ۱ قابل مشاهده است، عکس‌العمل ارتفاع ساقه نخود نسبت به بقایا و پاشش عصاره‌های آبی متفاوت بود، به طوری که در تیمار بقایای چغندر قند با کاهش ۵/۴ سانتی متر نسبت به تیمار شاهد بیشترین تأثیر منفی بر ارتفاع ساقه اصلی نخود مشاهده شد. از طرف دیگر ارتفاع ساقه نخود تحت تأثیر تیمارهای پاشش عصاره کلزا، پاشش عصاره چغندر قند و مخلوط پاشش عصاره چغندر قند و کلزا به ترتیب ۳۶/۵، ۱۴/۲۷ و ۹/۸ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. از این رو می‌توان گفت که تیمارهای بقایای گیاهی باعث کاهش ارتفاع ساقه اصلی شدند. کاهش ارتفاع ساقه گیاه نخود می‌تواند به دلیل تأثیر بازدارندگی مواد



شکل ۱- تأثیر بقایا و پاشش عصاره آبی گیاهان چغندر قند و کلزا بر ارتفاع ساقه اصلی نخود

Fig. 1. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the height of chickpea main stem

میانگین‌های دارای حروف متفاوت در هر شکل تفاوت معنی‌داری براساس آزمون LSD دارند ($P \leq 0.05$).

Means with different letters for each bar have significant difference according to $LSD_{5\%}$.

تعداد غلاف در بوته

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تعداد غلاف در بوته نخود به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (جدول ۳). بیشترین و کمترین تعداد غلاف در بوته به‌ترتیب در تیمار شاهد با ۳۷/۳ عدد و تیمار بقایای کلزا با ۱۷/۶۷ عدد در بوته (۵۳/۵ درصد کاهش) مشاهده شد (شکل ۲). مشخص شده است که کم‌تر بودن تعداد غلاف در بوته باعث می‌شود که وزن ۱۰۰ دانه بیشتری داشته باشد و توانایی در تولید غلاف کمتر، منجر به تولید مخازن بیشتر برای مواد فتوسنتزی شده و مواد فتوسنتزی به تعداد دانه کمتری تخصیص یافته و سهم هر دانه از مواد فتوسنتزی بیشتر و در نتیجه وزن ۱۰۰ دانه بیشتری را به‌دنبال دارد (Sadghei poor *et al.*, 2004).

در پژوهش حاضر این وضعیت در تیمار بقایای کلزا و مخلوط پاشش عصاره چغندر قند و کلزا صدق می‌کند. از طرف دیگر کاهش تعداد غلاف در بوته به‌خاطر آزاد شدن تدریجی مواد آللوکمیkal از بقایای کلزا و ماندگاری آن تا مرحله غلاف‌دهی باعث شد اندام‌های زایشی شدیداً تحت تأثیر این مواد قرار گیرند.

در بین تیمارهای مورد آزمایش تیمار بقایای چغندر قند با ۳۲/۳ عدد غلاف در بوته کمتر تحت تأثیر قرار گرفت.

تعداد غلاف یکی از مهم‌ترین اجزای عملکرد است که بر عملکرد دانه بسیار مؤثر است. با توجه به یکنواختی خاک محل آزمایش، به‌جز تأثیر تیمارهای آزمایشی، سایر عوامل بر تعداد غلاف در بوته مؤثر نبوده و تلفاتی حتی از نظر بیماری‌ها و آفات نیز مشاهده نشد.


تعداد دانه در بوته

تعداد دانه در تیمار شاهد برابر ۳۱/۳۳ عدد مشاهده شد. بیشترین تعداد دانه در تیمار پاشش عصاره آبی کلزا برابر ۴۸ عدد بود که نسبت به تیمار شاهد ۵۳ درصد افزایش داشت (شکل ۲)، در حالی که کاربرد بقایای کلزا بر تعداد دانه نخود اثر منفی داشت. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل آزاد شدن مواد آللوکمیkal به‌تدریج در طول دوره رشد گیاه و اثرات منفی بر مراحل زایشی باعث کاهش تعداد دانه شده است و در مقابل، کاربرد پاشش عصاره آبی کلزا باعث تحریک رشد رویشی و زایشی گیاه نخود شده است. گزارش شده است که اگر تعداد دانه‌ها کاهش یابد، مخزن، قدرت کافی برای جذب مواد فتوسنتزی را نداشته و میزان محصول بیشتر از حالتی که وزن ۱۰۰ دانه کاهش یابد، کم می‌شود. در کاهش وزن ۱۰۰ دانه ممکن است منبع، قدرت تأمین مواد فتوسنتزی کافی را نداشته باشد، ولی در کاهش تعداد دانه، منبع، مواد لازم را تولید می‌کند، ولی مخزن دچار محدودیت است (Koocheki & Sarmadnia, 1999).

وزن ۱۰۰ دانه

نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر وزن ۱۰۰ دانه، به ترتیب در تیمار پاشش عصاره آبی چغندر قند (۱۳/۹ گرم) و تیمار پاشش عصاره آبی کلزا (۳۱/۷ گرم) مشاهده شد (شکل ۲). این آزمایش نشان داد که در بین اجزای عملکرد نخود، حساس‌ترین جزء به مواد آلیوپاتی، تعداد غلاف در بوته بوده و وزن ۱۰۰ دانه از حساسیت کمتری نسبت به تعداد غلاف

برخوردار بود. هرچه تعداد دانه در غلاف کمتر باشد، توزیع مواد فتوسنتزی به تعداد دانه کمتری اختصاص یافته (شکل ۲) و به دنبال آن وزن هر دانه افزایش می‌یابد. محققان در بررسی همبستگی بین وزن ۱۰۰ دانه با تعداد دانه در غلاف نخود، به نتایجی مشابه با نتایج پژوهش حاضر رسیدند (Gepts & Debouck, 1991).



شکل ۲- تأثیر بقایا و پاشش عصاره آبی گیاهان چغندر قند و کلزا بر اجزای عملکرد نخود

Fig. 2. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the yield componts of chickpea


میانگین‌های دارای حروف متفاوت در هر صفت تفاوت معنی‌داری براساس آزمون LSD دارند ($P \leq 0.05$). Means with different letters for each trait have significant difference according to $LSD_{5\%}$.

بقایای گیاهی آفتابگردان باعث بهبود خصوصیات رشد نخود شده است که در نتیجه این امر، بهبود عملکرد نخود را به دنبال داشته است (Asadi *et al.*, 2015). نتایج مطالعه‌ای دیگر مؤید این مطلب است که مصرف عصاره آبی کلزا باعث افزایش عملکرد گیاه نخود به میزان ۳۹/۵ درصد نسبت به شاهد موجب شده است (Dadkhah & Rassam, 2015) که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.

عملکرد دانه^۱ (وزن دانه)

عملکرد دانه نخود در تیمار شاهد برابر ۱۶۹/۱۷ گرم در مترمربع به دست آمد (شکل ۳)، به طوری که بیشترین عملکرد دانه در تیمار پاشش عصاره کلزا با ۱۸۰/۳۳ گرم در مترمربع مشاهده شد که با افزایش تعداد دانه، وزن دانه نیز افزایش چشمگیری داشت. محققان در مطالعات خود گزارش کردند که کاهش جمعیت علف‌های هرز تحت تأثیر افزایش خاصیت دگرآسیبی

^۱ Grain yield



شکل ۳- تأثیر بقایا و پاشش عصاره آبی گیاهان چغندر قند و کلزا بر عملکرد نخود

Figure 3. The effect of residues and aqueous extracts sugar beet and canola on yield of chickpea.

میانگین‌های دارای حروف متفاوت در هر صفت تفاوت معنی‌داری براساس آزمون LSD دارند ($P \leq 0.05$). Means with different letters for each trait have significant difference according to LSD_{5%}.

رویشی و زایشی است. تأثیر بقایا و پاشش عصاره حاصل از گیاهان مورد آزمایش باعث عکس‌العمل متفاوت شاخص برداشت گیاه نخود گردید. شاخص برداشت در تیمار شاهد برابر با ۵۲/۴ درصد بود، در حالی‌که بیشترین و کمترین شاخص برداشت در تیمار بقایای چغندر قند و پاشش عصاره چغندر قند به ترتیب ۵۹/۲ و ۴۴/۱ درصد مشاهده شد که به ترتیب ۱۳ و ۱۶ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش و کاهش معنی‌دار در پی داشت (شکل ۳). کاهش شاخص برداشت در تیمار پاشش عصاره چغندر قند ناشی از کاهش چشمگیر تعداد دانه و وزن دانه بوده است. تأثیر پاشش عصاره چغندر قند، با وجود کاهش وزن خشک گیاه نخود، توانایی تولید تعداد بسیار معدودی دانه با وزن بسیار کم بود که نتیجه آن کاهش شدید در شاخص برداشت است. محققان گزارش کردند که بالابودن بیوماس بدان معنی است که محدودیت منبع وجود نداشته و میزان فتوسنتز بالا و CGR بالایی دارند، اما به دلیل این‌که سیستم توزیع مواد فتوسنتزی در این گیاهان نامطلوب است، میزان ماده کافی به قسمت‌های اقتصادی یعنی دانه منتقل نشده و به دلیل

عملکرد بیولوژیکی

اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بیولوژیکی نخود معنی‌دار ($P \leq 0.05$) بود (جدول ۳)، به طوری‌که عملکرد بیولوژیکی گیاه نخود در تیمار شاهد ۳۱۹/۴ گرم در مترمربع مشاهده شد که با مصرف بقایا و پاشش عصاره آبی عملکرد بیولوژیکی کاهش یا افزایش یافت. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی گیاه نخود در تیمار پاشش عصاره کلزا و پاشش عصاره چغندر قند که به ترتیب ۳۲۹/۴ و ۱۹۲/۱ گرم در مترمربع به دست آمد (شکل ۳). احتمالاً بیشتر بودن عملکرد بیولوژیکی در تیمار پاشش عصاره کلزا را می‌توان به تأثیر بازدارندگی بر علف‌های هرز و همچنین بالابودن تعداد دانه و وزن دانه در بوته نخود نسبت داد.

شاخص برداشت^۱

شاخص برداشت نشان‌دهنده میزان مواد انتقال یافته و ذخیره شده در دانه نسبت به کل مواد تولید شده در دوران رشد

^۱ Harvest index

در نتیجه کاهش تراکم و زیست توده علف‌های هرز را موجب گردید. در مجموع نتایج نشان داد که در درجه اول تیمار پاشش عصاره آبی کلزا، با کنترل مطلوب و موثر علف‌های هرز و همچنین با داشتن بیشترین عملکرد نخود به‌عنوان تیمار برتر آزمایش بوده و در درجه دوم تیمار مخلوط پاشش عصاره آبی چغندر قند و کلزا با کاهش علف‌های هرز و افزایش عملکرد و اجزای عملکرد نخود قابل توصیه می‌باشد. بدین ترتیب، در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار می‌توان عصاره آبی چغندر قند و کلزا را برای کنترل علف‌های هرز و بهبود عملکرد نخود به‌عنوان یکی از حبوبات مهم و ارزشمند مدنظر قرار داد.

محدود بودن مخزن، ظرفیت پذیرش زیاد مواد فتوسنتزی وجود ندارد (Koocheki & Sarmadnia, 1999).

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج این آزمایش مشاهده شد که بقایا و عصاره آبی چغندر قند و کلزا دارای پتانسیل آلوپاتیکی هستند و با توجه به زراعی بودن دو گیاه چغندر قند و کلزا، که جزء گیاهان زراعی استراتژیک می‌باشند، امکان استفاده از آنها در تناوب زراعی یا در کشت‌های مخلوط جهت کنترل علف‌های هرز وجود دارد، به طوری که استفاده از بقایا و عصاره آبی به دلیل دارا بودن خاصیت دگرآسیبی، مانع جوانه‌زنی و رشد علف‌های هرز شد و

منابع

1. Alboghbeish, J., Dadkhah, A.R., Khairkhan, M., and Zaremehjordi, M. 2014. Allelopathic Effect of Wheat, Canola and Ephedra on Growth Index of Weeds and *Glycine max* L. Plants in Field Conditions. MSc, Thesis. Shirvan Higher Education Complex. Iran. 66pp. (In Persian with English Summary).
2. Arefiyan, M., Rabie, M., Asri, Y., and Bakhshi Khaniki, Gh. 2013. Comparison on canopy coverage estimation methods of *Calligonum comosum* L'Her. and *Amygdalus eburnea* Spach in Shahr-e-babak of Kerman (Iran). Iranian Journal of Range and Desert Research 20(4): 769-782. (In Persian with English Summary).
3. Babaeinjad, B., Dadkhah, A.R., Rassam, G.A., and Ghorbanzadehngah, M. 2014. Allelopathic effect of sugar beet, canola and ephedra on germination and growth of weed *Solanum nigrum*. The 1st National Conference on Stable Agriculture and Natural Resources. (In Persian with English Summary).
4. Dadkhah, A.R. 2012. Phytotoxic potential of sugar beet (*Beta vulgaris*) and eucalyptus (*Eucalyptus camaldulensis*) to control purslane (*Portulaca oleracea*). Acta Agriculture Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 46(6): 1- 6.
5. Dadkhah, A.R. 2014. Allelopathic potential of canola and sugarbeet to control weeds in soybean (*Glycine max*). Russian Agricultural Sciences 41(2-3): 111-114.
6. Dadkhah, A.R., and Rassam, Gh. 2016. Allelopathic potential of canola and sugarbeet to control weeds in chickpea. Indian Journal of Weed Science 47(2): 131-135.
7. De Neergard, A., and Porter, J. 2000. Allelopathy. Department of Plant Pathology, Physiology and Weed Science <http://www.kursus.kvl.dk/sharesea/03Projects/32gamle/Project%20files/allelopathic>
8. El-Khatib, A., Hegazy, A.K., and Gala, H.K. 2004. Does allelopathy have a role in the ecology of *Chenopodium murale*? Annuals of Botany Fennici 41: 37-45.
9. Fenwick, G.R., Heaneg, R.K., and Mullin, W.J. 1983. Glucosinolates and their breakdown products in food and food plants. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 18: 123-301.
10. Gepts, P., and Debouck, D. 1991. Origin, domestication and evolution of the common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). In: A. Van Schoonhoven and O. Voysest (Eds.). Common Bean: Research for Crop Improvement. CIAT, Cali, Colombia. pp. 7-53.
11. Guenzl, W.D., Mccalla, T.M., and Norstadt, F.A. 1967. Presence and persistence of phytotoxic substance in wheat, oat, corn and sorghum residues. Agronomy Journal 59: 163-165.
12. Hegab, M.M., Khodary, S.E.A., Hammouda, O., and Ghareib, H.R. 2008. Autotoxicity of chard and its allelopathic potentiality on germination and some metabolic activities associated with growth of wheat seedlings. African Journal of Biotechnology 7(7): 884-892.
13. HJazi, A. 2000. Allelopathy. Tehran University Press. (In Persian).
14. Hutchinson, C.M., and McGiffen, M.E. 2000. Cowpea cover crop mulch for weed control in desert pepper production. HortScience 35: 196-198.
15. Jahani, H., Dadkhah, A.R., and Rassam, G.A. 2015. Allelopathic effect of sugar beet, sunflower and cotton on growth index of weeds and sugar beet (*Beta vulgaris*) plants in field conditions. MSc, Thesis. Shirvan Higher Education Complex. Iran. 73pp. (In Persian with English Summary).
16. Koocheki, A., and Sarmadnia, G.H. 1999. Crop Physiology. Ferdowsi University of Mashhad Press. (In Persian).

17. Mallek. S., Partner, T.S., and Stapleton, J. 2007. Interaction effects of *Allium* ssp. Residues concentrations and soil temperature on seed germination of four weedy plant species. *Applied Soil Ecology* 37: 233-239.
18. Menan, H., Ngouajio, M., Isik, D., and Kaya, E. 2006. Effect of alternative management systems on weed populations in hazelnut (*Corylus avellana* L.). *Crop Protection* 25: 835-841.
19. Petersen, J., Belz, R., Walker, F., and Hurle, K. 2001. Weed suppression by release of isothiocyanates from *Turin rape* mulch. *Agronomy Journal* 93: 37- 43.
20. Rashdmohasel, M.H, and Moosavi, K. 2006. *Weed Management Principles*. Ferdowsi University of Mashhad Press. 545pp. (In Persian).
21. Rice, E.L. (1984). *Allelopathy*. Academic Press, 2nd Edition. New York. pp. 368.
22. Sadeghi Poor, A., Ghafari Khalij, H., and Monem, R. 2004. Effect of plant density on yield and yield components limited growth figures and unlimited growth of red beans. *Journal of Agricultural Sciences* 149-159. (In Persian with English Summary).
23. Seyed Sharifi, R., Farzaneh, S., and Seyed Sharifi, R. 2007. Comparison of chemical control and allelopathic effect of weeds in chickpea under rainfed conditions. *Iran Journal Biology* 20(4): 334-343. (In Persian with English Summary).
24. Teasdale, J.R., Beste, C.E., and Potts, W.E. 1991. Response of weeds to tillage and cover crops residue. *Weed Sciences* 39: 195-199.
25. Xuan, T.D., Tawata, S., Khanh, T.D., and Chung, I.M. 2005. Biological control of weeds and plant pathogens in paddy fields by exploiting plant allelopathy. An Overview. *Crop Protection* 24: 197-206.
26. Zand, A., Rahimyanmashhadi, H., Koochaki, A., Khalghani, J., Moosavi, K., and Ramazani, K. 2004. *Weeds Ecology*. Ferdowsi University of Mashhad Press. 558pp. (In Persian).

Effect of sugar beet (*Beta vulgaris*) and canola (*Brassica napus*) residue on weeds, yield and yield components of chickpea (*Cicer arietinum*)

Babaeinjad^{1*}, B. & Aadkhah², A.

1. MSc. Student, Faculty of Agriculture, Shirvan Higher Education Complex, Shirvan, Iran
2. Associate Professor, Faculty of Agriculture, Shirvan Higher Education Complex, Shirvan, Iran

Received: 30 May 2016
Accepted: 27 December 2016

DOI: 10.22067/ijpr.v9i1.56050

Introduction

Weeds have significant negative effects on agricultural ecosystems. They are responsible for the decline of crop yield because of competition with crops for water, nutrients and sunlight. Existing weed control methods are either expensive or hazardous. Heavy use of chemical herbicides in most integrated weed management systems is a major concern since it causes serious threats to the environment, public health and increase cost of crop production. Therefore, alternative strategies against weed must be developed. Allelopathy is defined as the inhibitory/stimulatory effect(s) of one plant on other plants through the release of chemical compounds into the surrounding environment. It is characterized by a reduction in plant emergence or growth, reducing their performance in the association. Allelopathy provides a relatively cheaper and environmental friendly weed control alternative. This can be considered as a possible alternative weed management strategy. A number of plants have also been known to exhibit allelopathic property on other plants. Allelopathy associated with plants due to the presence of allelochemicals such as monoterpenes, phenolic and volatile compounds in their foliage. Therefore, the present study was done to develop management practices to reduce the use of agro-chemicals for sustainable agriculture. Therefore, the effects of allelopathic potential of sugar beet and canola on suppression of some weeds of chickpea farm were studied.

Material & Methods

A field experiment based on a randomized complete block design with four replications was carried out in a naturally weeds infested land to investigate the allelopathic effects of canola (*Brassica napus* L. var Ocapı) and sugar beet (*Beta vulgaris* Var Jolge) residues on weeds and yield of chickpea (*Cicer arietinum*) at research center of Shirvan Agricultural College (37° 23' north latitude and 57° 54' east longitude and altitude of 1060 meters), North Khorasan Province, Iran. Seven treatments including I: chopped residues of canola (1.5 kg m⁻²), II: chopped residues of sugar beet (1.5 kg m⁻²) both were separately incorporated to 25 cm depth soil uniformly 20 days before sowing, III: chopped residues of canola and sugar beet mix together (0.75 kg/m² each), IV: shoot aqueous extract of canola, V: shoot aqueous extract of sugar beet VI: mixed adequate extract of canola & sugar beet, which were separately sprayed at post emergence stage (at 7, 15 and 30 days after sowing) and VII: without any residues and spraying as control. For preparation of aqueous extract, chopped shade dried residues of canola and sugar beet were separately ground into fine powder (using an electric mill). One hundred g of ground tissue of each of the tested species was placed in a 2 L Erlenmeyer flask and 1 L distilled water was added and left for 48 h at room temperature. The mixtures were then filtered through a double layer of cheese cloth followed by Whatman No.1 filter paper using a vacuum pump. Water extracts were applied between rows at the rate of 100 ml per square meter twice at 7 and 14 days after sowing (DAS) using a knapsack hand-sprayer fitted with a flat fan nozzle maintaining a pressure of 207 kpa.

Results & Discussion

The result of experiment showed that growth traits of weeds and chickpea plant are significantly affected by treatments. Maximum inhibition on weed density, weed dry weight, weed coverage (%) and the height of chickpea plants were recorded when using sugar beet residues incorporated with soil. So weed density, weed dry weight, weed coverage and the height of chickpea plants decreased by 52.4%, 90.15,

*Corresponding Author: behrouzbabaeinjad@gmail.com

52.6% and 25.2%, respectively, compared to control. The highest (329.4 g m⁻²) and lowest (192.1 g m⁻²) chickpea dry weight were obtained in shoot aqueous extract of canola and shoot aqueous extract of sugar beet, respectively. The highest harvest index (59.2%) observed in plants treated with sugar beet residues. Some studies reported that allelochemicals like salt and drought stresses exhibited inhibitory effects on physiological processes that translate to growth. The effects of allelopathy on germination and plant growth may occur through a variety of mechanisms including reduced mitotic activity in roots and shoots, suppressed hormone activity, reduced rate of nutrient uptake, inhibited photosynthesis and respiration, inhibited protein formation, decreased permeability of cell membranes and/or inhibition of enzyme action. Weed cover reduction can be closely linked to slower leaf production and development of smaller leaves. It was reported that at stress condition leaf area decreases due to a combination of a decrease in cell number and in cell size. A possible reason for dry matter reduction could be the greater reduction in uptake and utilisation of mineral nutrients by plant under allelochemical stress condition. Hegab *et al*, (2008) found that higher concentration of allelochemical induced inhibitory effect on amylase activity in wheat seedlings. They also reported the application of allelochemicals at high concentrations decreased protein content of wheat seedlings.

Conclusion

The present study concludes that integrating canola and sugar beet residues has the potential to suppress weeds germination and growth. These residues can be used as an eco-friendly approach to manage weeds in chickpea fields.

Key words: Biomass, Chickpea, Chopped residues, Density, Weed management